


パルミコート[®]吸入液を使用される患者さんへ

先生に指示された用法・用量を守りましょう。
自己判断でお薬の量を増減したり、中止しないでください。

準備するもの


◎パルミコート吸入液のアンプル

アルミ袋からアンプルを取り出します。




◎ネブライザー(ジェット式)

薬液ボトルを取り出します。
先生からすすめられた
ネブライザーを
使用してください。




吸入の準備

吸入時には新しいアンプルをご使用ください。




1 1回分のアンプルを切り離します。

下から切り離さないようにアンプルの上部を持ち、
前後にさくようにしてください。




2 アンプルの上部を持ち、振り混ぜます。

泡立っていない程度の強さで、円を描くようにゆっくりと
振り混ぜます。



3 上部をねじり切って開封します。

薬液がこぼれないようにアンプルを垂直に立て、
開封します。



4 ネブライザーの薬液ボトルに薬液を入れます。

アンプルの中の薬液を全部搾り出します。

※ネブライザーの取扱説明書に従い使用してください。

5 ネブライザーに薬液ボトルをセットして 吸入をはじめましょう。

霧状になった薬液がネブライザーから
出なくなるまで吸入します。

吸入後に必ずうがい、または口すすぎをしてください。
フェイスマスクを使用する場合は、顔を洗ってください。



吸入方法例

ネブライザーの取扱説明書※に従い使用してください。

マウスピース使用の場合

マウスピースを口にくわえて霧状になった薬液が出始めたら、深くゆっくりと吸入し、マウスピースを通してゆっくりと吐き出します。

※ネブライザーの使用方法については各販売会社にお問合せください。



吸入後の注意点

- うがいができない場合は、口をすすいだり水分をとってください。
- フェイスマスクを使用する場合には口のまわりに薬剤が付着している可能性があるため水で顔を洗ってください。
- 顔を洗えない場合は、湿ったガーゼなどで顔をぬぐってください。



使用時の注意点

- ★保管用アルミ袋開封後は2ヵ月以内に使用してください。
- ★未使用のアンプルは、光を避けるため、必ずアルミ袋に保管してください。
- ★凍結を避けて小さなお子様の手の届かないところに保存してください。
- ★吸入時は新しいアンプルを使用して、開封済のものや、ネブライザー内の残液は使わないでください。

こんなときはどうするの？

Q 決まった時間に吸入するのを忘れてしまったらどうしたらよいですか？

A 気づいたらすぐに吸入しましょう。
もし次の吸入時間に近い場合は、前回の1回分を追加せず、いつものスケジュールどおり吸入してください。

Q 吸入する別のお薬が処方されていますが、混ぜて吸入してもよいですか？

A 先生の指示に従ってください。
もし、特別な指示がない場合は、ほかのお薬と混ぜずに吸入してください。

Q お薬が手についたときはどうすればよいですか？

A 手にお薬がついた場合、かぶれなどが起こるかもしれませんので、念のため水で洗ってください。

Q アンプルに入っているお薬をこぼしてしまったときはどうすればよいですか？

A こぼしてしまったお薬のアンプルは廃棄して、新しいアンプルを使用してください。

Q 発作が起こったら、どうしたら良いですか？

A パルミコート吸入液は、すでに起こっているぜんそく発作をおさえるお薬ではありません。
このお薬を使用している期間中に発作が起こった場合は、できるだけ早く受診してください。

お問い合わせ先

アストラゼネカ株式会社

受付時間／月～金 9:00～18:30 (土日・祝日除く)

メディカルインフォメーションセンター

0120-119-703

RES802[B211]
2010年11月作成